



Ministry of Health – State of Kuwait

Kuwait Childhood Immunization Schedule 2019

Age of Vaccination	Vaccine Type	Route of Administration
Pregnant mother	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 doses of Tetanus Toxoid at 5th & 7th Month of 1st Pregnancy. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.M
Within 24 hrs of birth	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1st Dose of Hepatitis B (HBV) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.M
End of 2nd month	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1st Dose of IPV ▪ 1st Dose of DPT/HBV/Hib* ▪ 1st Dose of Pneumococcal (Ped) ▪ 1st Dose of Rota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.M ▪ I.M ▪ I.M ▪ Oral
End of 3rd month	<ul style="list-style-type: none"> ▪ - BCG vaccine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.D.
End of 4th month	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2nd Dose of IPV ▪ 2nd Dose of DPT/HBV/Hib* ▪ 2nd Dose of Pneumococcal (Ped) ▪ 2nd Dose of Rota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.M ▪ I.M ▪ I.M ▪ Oral
End of 6th month	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3rd Dose of IPV ▪ 3rd Dose of DPT/HBV/Hib* ▪ 3rd Dose of Pneumococcal (Ped) ▪ 3rd Dose Rota ** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.M ▪ I.M ▪ I.M ▪ Oral
End of 12 months	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1st Dose of OPV ▪ 1st Dose MMR Vaccine ▪ 1st Dose Varicella Vaccine ▪ Conjugate Meningitis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oral ▪ S.C. ▪ S.C. ▪ I.M.
At 18th month	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2nd Dose of OPV ▪ Booster Dose of DPT/HBV/Hib* ▪ Booster Dose Pneumococcal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oral ▪ I.M ▪ I.M
End of 2 years	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2nd Dose MMR Vaccine ▪ 2nd Dose Varicella Vaccine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S.C. ▪ S.C.
End of 3.5 years	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Booster Dose of OPV ▪ Booster Dose of DPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oral ▪ I.M
4-6 years (Preschool)	Before school admission every child should be Checked or Immunization status for the appropriate vaccines as mentioned before	
10-12 years (at School)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Booster Dose of MMR (for females only) ▪ Booster Dose of Tetanus/Diphtheria. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S.C ▪ I.M
16-18 years (at School)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Booster Dose of Tetanus/Diphtheria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I.M

* Diphtheria Tetanus Pertussis Toxoid, Hepatitis B Vaccine, Haemophilus influenza b Vaccine.

** a third dose is needed when RV5 is used.



وزارة الصحة – دولة الكويت

جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت - 2019

طريقة الإعطاء	نوع الطعم	السن عند التطعيم
<ul style="list-style-type: none"> في عضلة الكتف في عضلة الكتف 	<ul style="list-style-type: none"> جرعتان من طعم التيتانوس (عند الشهر الخامس والسابع من الحمل الأول) جرعة من طعم التيتانوس عند كل حمل قادم 	الحوامل
<ul style="list-style-type: none"> في عضلة الفخذ الأمامية 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الأولى من طعم الالتهاب الكبدي ب 	خلال 24 ساعة من الولادة (حديثي الولادة)
<ul style="list-style-type: none"> في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية بالضم 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الأولى من طعم النسلل بالحقن (ثلاثي الفصيلة) الجرعة الأولى من طعم الخماسي* الجرعة الأولى من طعم الالتهاب الرئوي (النيموكوكال) الجرعة الأولى من طعم الروتا** 	نهاية الشهر الثاني
<ul style="list-style-type: none"> داخل الجلد في الجزء العلوي الجانبي من الذراع الأيسر 	<ul style="list-style-type: none"> طعم الدرن (بي سي جي) 	نهاية الشهر الثالث
<ul style="list-style-type: none"> في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية الضم 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الثانية من طعم النسلل بالحقن (ثلاثي الفصيلة) الجرعة الثانية من طعم الخماسي الجرعة الثانية من طعم الالتهاب الرئوي (النيموكوكال) الجرعة الثانية من طعم الروتا 	نهاية الشهر الرابع
<ul style="list-style-type: none"> في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية بالضم 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الثالثة من طعم النسلل بالحقن (ثلاثي الفصيلة) الجرعة الثالثة من طعم الخماسي الجرعة الثالثة من طعم الالتهاب الرئوي (النيموكوكال) الجرعة الثالثة من طعم الروتا 	نهاية الشهر السادس
<ul style="list-style-type: none"> تحت الجلد في الذراع نقطتان بالضم تحت الجلد في الذراع في عضلة الفخذ 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الأولى من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف الجرعة الأولى من طعم النسلل بالضم (ثنائي الفصيلة) الجرعة الأولى من طعم الجديري طعم السحايا المتقارن 	عند استكمال السنة الأولى من العمر
<ul style="list-style-type: none"> نقطتان بالضم في عضلة الفخذ الأمامية في عضلة الفخذ الأمامية 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الثانية من طعم النسلل بالضم (ثنائي الفصيلة) جرعة منشطة من طعم الخماسي جرعة منشطة من طعم الالتهاب الرئوي (النيموكوكال) 	عند عمر سنة ونصف
<ul style="list-style-type: none"> تحت الجلد في الذراع تحت الجلد في الذراع 	<ul style="list-style-type: none"> الجرعة الثانية من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف الجرعة الثانية من طعم الجديري 	عند عمر السنتين
<ul style="list-style-type: none"> نقطتان بالضم في العضل 	<ul style="list-style-type: none"> جرعة منشطة من طعم النسلل بالضم (ثنائي الفصيلة) جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا - تيتانوس - سعال ديكوي) 	عند عمر ثلاث سنوات ونصف
التأكد من الحالة التطعيمية للطفل واستكمال التطعيمات الناقصة (إن وُجدت)		من 4-6 سنوات (قبل دخول المدرسة)
<ul style="list-style-type: none"> تحت الجلد في الذراع في العضلة الدالية بالذراع 	<ul style="list-style-type: none"> جرعة منشطة من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف جرعة منشطة من طعم الثنائي البكتيري (دفتريا - تيتانوس) 	من 10 - 12 سنة (بالمدارس)
<ul style="list-style-type: none"> في العضلة الدالية بالذراع 	<ul style="list-style-type: none"> جرعة منشطة من طعم الثنائي البكتيري (دفتريا - تيتانوس) 	من 16 - 18 سنة (بالمدارس)

*الطعم الخماسي يحتوي على الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي والهييموفيليس انفلونزا والكبدي ب

** تعطى جرعات الروتا وفقاً لنوع الطعم المستخدم بواقع 2 أو 3 جرعات